





3. CUM RECUNOSC INFARCTUL DE MIOCARD ?

CUM RECUNOSC INFARCTUL DE MIOCARD ?

Cele mai frecvente simptome ale infarctului miocardic sunt:

- Durere brusc apărută în mijlocul pieptului (apăsare violentă, strângere, presiune sau strangulare); durerea poate iradia în umeri, ambele brațe, la baza gâtului și/sau în mandibulă;
- Simptome care pot însoți durerea:
 - Respirație greoaie
 - Transpirații reci, paloare
 - Teamă (anxietate)
 - Palpitații (bătăi neregulate ale inimii)
 - Greață



Dacă aceste simptome persistă mai mult de 15 minute, luați în considerare un infarct de miocard și sunați imediat la 112 !

ANGIOPLASTIA CORONARIANA CU MONTARE DE STENT


1. Cu ajutorul unui ghid (fir) metalic introdus într-o arteră de la picior sau mână, stentul este direcționat până ajunge la nivelul stenozei coronariene. În interiorul stentului se afla

și un balon deșumflat;

2. Balonul este umflat și, în felul acesta, stentul este expandat. În acest fel stenoza este și ea dilatăta;


3. După expandarea stentului, balonul este deșumflat și, împreună cu ghidul, este retras. Stentul

ramâne lipit de peretii arterei coronare ca un mic tub metalic. Treptat el va fi acoperit în interior de celule normale ale peretului arterial, fiind înglobat în peretele arterei.



IMPORTANT !

Cu cât reperfuzia coronariană este realizată mai repede, cu atât aria de necroză (infarct) va fi mai mică, iar recuperarea inimii va fi mai bună. Acest beneficiu poate fi obținut dacă reperfuzia este efectuată în primele 4-6 ore de la debutul infarctului. În felul acesta evoluția ulterioară poate fi bună, mulți dintre pacienți putându-și relua activitatea obișnuită.



Nu aștepta ! Sună imediat la 112 !



“TOTUL PENTRU INIMA TA !”

o campanie a

**Societății Române de Cardiologie,
Fundației Române a Inimii,**

**Inițiativei “Stent for Life” – România și a
Consiliului Național Român de Resuscitare**

112 !